

Skogsbruksplan

Planens namn	Näset 58:3 PEFC
Planen avser tiden	fr o m 2025-07-30 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	Älvdalens Besparingsskog
Planläggningsmetod	SKS skogliga grunddata Planen uppdaterad utifrån SKS laserskannade skogliga grunddata.
PEFC-certifiering	ok
Ägarförhållanden	
Ägare, 1/1	Se Fastighetsutdrag för fullständig ägarfördelning
Skoglig kontakt (org)	Bo Stefan Graaf e-post: s.graaf@hotmail.se
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	Näset 58:3 Dalarnas län, Älvdalen, Älvdalen



Kommentarer till Näset 58:3 PEFC

2026-06-22 Ajourhållning utan fältbesök

Ägarförhållanden och avfattning kontrollerade. Hämtat in utförda avverkningar SKS, historik, avd-kommentarer, karttecken, speciella värden, skogliga grunddata 2020-08-25 2022-06-24 2022-06-25, utförda åtgärder enligt skogsägaren samt ÄB arkiv. Tillväxtframskrivning, översyn indelning utfört. Virkesuttag vid åtgärder enligt schablon. Åtgärdsförslag och plankommentarer uppdaterade.

Kontrollerat lövandel, naturvårdsavsättningar.

/Älvdalens Besparingsskog

Lagfarna ägare enligt Lantmäteriet 2026-06-22

Se fastighetsutdrag för aktuella och kompletta uppgifter.

Karl-Erik Eriksson

Agneta Krångh

Siv Anna-Greta Heed

Stefan Graaf

2021-11-22

Åtgärder i planen efter laserskanningen 2018

Skogsbruksplanen har sitt ursprung i de gröna planer som producerats vid Besparingsskogens tidigare planprojekt 1999-2003 resp 2007-2013, samt i den laserskanning av delägarmarken som utfördes i juli 2018. Virkesuppgifter som volymer, diametrar och höjder kommer från Skogsstyrelsens laserskanning som i Älvdalen huvudsakligen utförts under perioden 2020 - 2022, men även data från besparingsskogens skanning 2018 kan förekomma. Därefter har tillväxtberäkning utförts.

Trädslagsfördelning, ståndortsuppgifter och målklassning är hämtade från uppgifter i de gamla planerna i vår databas. Den gamla planen har ajourhållits utan fältbesök vid ett tillfälle 2012-09-20.

Uppgifter om speciella värden som berör innehavet är hämtade från olika offentliga register, tex från Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, SLU etc.

Uppgifter om utförda åtgärder är hämtade ifrån den gamla planen, från uppgifter om skogsvårdsbidrag, samt från Skogsstyrelsens kartsnitt.

Planen är granskad av utbildad skogsbruksplanläggare för att uppfylla kraven för PEFC-certifiering.

Granskningen av åtgärdsförslag och tidigare gjorda naturvårdsavsättningar är utförd avdelningsvis genom fjärranalys bland annat med hjälp av röjningsskikt, gallringsskikt och skogshöjdskartor från laserskanningen. För avdelningar som saknar åtgärdsförslag har inget åtgärdsbehov identifierats under planperioden, dvs den närmaste 10-årsperioden.

Inga fältbesök har utförts vid granskningen av den här planen.

Skogstillstånd

Innehavet består av flera skiften belägna inom Näsets skifteslag i Älvdalens kommun. Den totala arealen är 69,3 ha varav 66,4 ha klassats som produktiv skogsmark. Medelboniteten beräknas till 4,6 m³sk/ha/år och den dominerande marktypen är blåbär på frisk mark. Höjden över havet varierar mellan 290 och 630 meter. Den totala virkesvolymen beräknas till 8579 m³sk och består av 67% tall, 27% gran och 6% löv. Lövet som finns är främst björk. Virkesförrådet är i medeltal 129 m³sk/ha.

Åldersfördelningen är spridd, men med en övervikt för yngre och medelålders skog. 73% är under 70 år.

Lövandel

Ett viktigt regionalt naturvårdsmål är att öka lövandelen i landskapet, detta sker generellt genom att alltid gynna löv där goda förutsättningar finns.

Andel bestånd utpekade som lämpliga för lövdominans på frisk och fuktig mark inom innehavet är ca 9,8 % (6,5 ha). Aktuell andel med lövdominans är 0,5% (0,3 ha).

Skogsmarkens förutsättningar

Innehavet ligger i förhållandevis karga marker i det norra barrskogsbältet varför de naturliga förutsättningarna för löv är begränsade. Där förutsättningar för löv finns gynnas löv vid alla åtgärder.

Skogsproduktionsmål

Mål med produktionen är att idka en god skogsvård och producera virke av bra kvalitet samt att utnyttja markens naturgivna produktionskapacitet och förmåga.

Innehavet har bra tillväxtpotential vid rätt skötsel, där röjning och gallring utförs i rätt tid. Genom täta

föryngringar och höga stamantal i kombination med kvalitetsinriktade röjningar nås en bra grund för god kvalitetsutveckling.

Naturvårdsmål

Bevara NO-bestånden och låt dem utvecklas fritt och få höga naturvärden. Krävande arter bland flora och fauna har svårt att överleva i den väl skötta produktionsskogen och deras överlevnad är idag hotad, därför bör vissa områden lämnas orörda för att ge dessa arter livsutrymme.

En liten andel död ved finns inom innehavet. Tillgång på död ved är en bristvara i dagens skogar och därför är de arter som lever på och i lågor och torra träd hotade. Det krävs ett aktivt ökande av andelen död ved, genom att vindfällan sparas och högstubbar tillskapas vid avverkningar samt att alla torra och döende träd sparas!

Speciella värden

Från offentliga register har kontrollerats om innehavet berörs av speciella värden. Det är känt att innehavet berörs av nutida och framtida lövdominans, nyckelbiotop, sumpskog, rödlistan, särskilt viktiga vatten samt den nationella våtmarksinventeringen.

81,9 % av innehavet saknar uppgift om speciella värden.

Naturvärden

Av den produktiva arealen är 3,9%, 2,6 ha, avsatt som naturvård orört (NO) och 1,8% 1,2 ha som NS.

Alla NV-bestånd kan inte tillgodoräknas vid certifiering, oftast beror det på att arealen är för liten för att kunna tillgodoräknas enligt aktuella regler. Inräknat i certifiering är 5,3%, 3,5 ha.

Nyckelbiotopen är ett örtrikt granbestånd med lövinslag på fuktig till blöt mark i anslutning till en bäck. Flera av NV-bestånden finns i anslutning till vattendrag. Dessa biotoper fungerar som refugier för krävande djur- och växtarter. Med tiden kommer höga naturvärden att skapas om de fortsättningsvis lämnas orörda.

Kulturvärden

Skogen i området är präglad av branden. Historiskt sett var branden den största styrande faktorn i naturen och skogen brann i genomsnitt vart 100:e år, naturligt eller genom människans försorg. I det gamla bondesamhället användes skogsmarken till bete av husdjur och slåtter på lämpliga delar. I samband med gruvdriftens utveckling växte en mer ordnad skogsskötsel fram med kalavverkningar och kolvedhuggningar, för att förse gruvor med ved och kol.

Brandspår och spår av mänsklig aktivitet efter ängsbruk, myrslåtter och kolframställning har stora kulturvärden som är värda att bevara. Visa hänsyn till gamla brandstubbar, fångstgropar, rösen, tjärdalar, kolbottnar och kojruiner.

Avverkning

Tillväxten för hela 10-årsperioden beräknas till 2870 m³sk, varav 2683 m³sk i PG bestånden. Grundförslaget på avverkningar under planperioden är 2340 m³sk varav 1096 m³sk gallring. Beroende på utfall av föreslagna inventeringar och alternativa åtgärder kan virkesutfallet bli både högre och lägre.

Vid avverkningsförslagen har en uttagsprocent på 95 % angetts. Resterande 5 % motsvarar ungefär den generella hänsyn som enligt Skogsvårdslagen krävs vid föryngringsavverkning.

Skogsvård

För 15,6 ha föreslås röjningsinventering och röjning snarast eller gallring senare. Röjning och gallring utförda i rätt tid gynnar tillväxten och bidrar till hållbara ungskogar av god kvalitet.

För 7,4 ha föreslås markberedning och plantering snarast.

Markberedning och plantering tillkommer som följd av utförda avverkningar.

Övriga åtgärder

Rågångarna behöver kontinuerligt ses över och förbättras.

Viltskador/Viltvård

Betetrycket är förhållandevis stort i området främst av älg, detta måste beaktas i samband med röjning, plantering och andra föryngringsåtgärder. Älgskadorna på tallungskogen är ganska stort vid framtida åtgärder bör därför uttaget styras så att oskadade stammar gynnas.

Laserskanning

På avdelningsnivå kan man förvänta sig att skattningarna håller samma precision som vid inventering i fält. Medelfelet i %, dvs det i snitt förväntade felet ligger inom intervallet 6-26%.

- Medelhöjd: 6-8%
- Medeldiameter: 11-16%
- Grundyta: 18-26%
- Virkesförråd: 20-27%

PEFC

På certifierade brukningsenheter avsätts minst 5 % av den produktiva skogsmarken för naturvårdsändamål. I första hand prioriteras höga naturvärden såsom nyckelbiotoper, därutöver områden med utvecklingsbara naturvärden eller områden av stor vikt för friluftsliv och rekreation. Undantag gäller för markinnehav om mindre än 20 ha produktiv skogsmark där områden med höga naturvärden saknas. Avsättningen ska markeras i skogsbruksplanen.

FSC

På certifierade brukningsenheter avsätts minst 5 % av den produktiva skogsmarken för naturvårdsändamål (målklass NO eller NS). Avsättningen ska markeras i skogsbruksplanen. I första hand prioriteras höga naturvärden såsom nyckelbiotoper, därutöver områden med utvecklingsbara naturvärden eller områden av stor vikt för friluftsliv och rekreation. Avsättningen ska markeras i skogsbruksplanen. Ytterligare minst 5% ska omfattas av anpassat brukande.

Gödsling

Skogsgödsling med kväve är nästan alltid en lönsam åtgärd som kan ge ekonomisk avkastning redan efter ungefär 10 år. Gödslingen utförs oftast som en engångsgödsling för att bygga upp virkesförrådet inför slutavverkningen. En sådan gödsling är ofta mycket lönsam, förräntningen av gödslingskostnaden kan vara 10-15 % per år. Ibland kan det dock löna sig att gödsla även tidigare under beståndets utveckling.

Hyggesvila

Att vänta med plantering (hyggesvila) är en metod att undvika snytbaggeskador. Under de första två säsongerna efter avverkning är snytbaggetrycket i stort sett alltid högt. Först om man väntar 3-4 år med plantering blir skadorna acceptabelt låga om man använder obehandlade plantor. Plantering på äldre hyggen ger dock bekymmer med vegetationskonkurrens och nedsatt tillväxt för plantorna. På äldre hyggen blir också torkan i marken tidvis svår. Ska man tillämpa hyggesvila krävs därför en effektiv vegetations-behandling, t ex med markberedning.

Dikesrensning

Att dikesrensa kan vara en lönsam åtgärd eftersom det kan bidra till en ökad skogsproduktion. Planera vilka delar av hela dikets sträckning som du verkligen behöver rensa. Vissa delar av dikessystemet kan underhålla sig självt med hjälp av vattnets flöde. Andra delar gör kanske inte någon nytta för skogen och dem kan du lämna att växa igen. Att avgränsa vilka åtgärder som behövs och var sparar både pengar och miljö.

Snöskador

Stamrika yngre tallbestånd som ligger högre än 200 meter över havet är särskilt utsatta för snöskador. Det är främst klena stammar som drabbas av snöskador, eftersom de lätt böjs ned. Klena stammar är ofta undertryckta och har asymmetriska kronor. I utsatta lägen bör man därför inrikta uttaget mot dessa "högriskträd", det vill säga utföra en låggallring.


Röj och gallra tidigt

Vid röjningen grundläggs mycket av trädens stormfasthet. Röj ordentligt vid 2-4 meters höjd. Gallra tidigt. Sena gallringar i täta skogar ökar stormfällningsrisken. Gallra inte gran som är över 20 meter.

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	66,4	96
Myr/kärr/mosse	1,8	3
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,1	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,9	1
Summa landareal	69,2	
Vatten	0,1	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	5812	67	45,6
Gran	2286	27	10,7
Löv	481	6	2,8

Totalt	
m³sk	8579

Medeltal	
m³sk per hektar	129



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-07-30 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
287

Avverkningsförslag

	m³sk
Förnygringsavverkning	1222
Gallring	1096
Naturvårdande skötsel	22
Totalt under perioden	2340


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
303
m³sk per ha
4,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	7,4	11					
- 9 år							
10 - 19	11,2	17	477	43	100		
20 - 29	1,5	2	148	99	95	5	
30 - 39	7,5	11	576	77	93		7
40 - 49	7,9	12	950	120	87	5	8
50 - 59	5,8	9	981	169	89	9	2
60 - 69	7,2	11	1298	180	53	36	11
70 - 79	0,3		83	277		95	5
80 - 89	6,8	10	1841	271	55	39	6
90 - 99	2,4	4	383	160	43	49	8
100 - 109	0,2		50	250	60	30	10
110 - 119	1,5	2	426	284	9	85	6
120 +	6,7	10	1366	204	76	23	1
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	66,4	100	8579	129	68	27	6

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 28 % (18,6 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 20 % (13,2 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1	7,4	11					
K2							
Röjningsskog R1	2,2	3	61	28	100		
R2	3,1	5	88	28	100		
Gallringsskog G1	35,7	54	4261	119	79	14	6
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	8,4	13	2003	238	55	43	2
S2	5,8	9	1232	212	77	22	1
S3	3,8	6	934	246	24	59	17
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	66,4	100	8579	129	68	27	6

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	62,6	94,3	7645	89,1	2683	93,5	49
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	1,2	1,8	293	3,4	61	2,1	3
NO	2,6	3,9	641	7,5	126	4,4	5
Summa	66,4	100,0	8579	100,0	2870	100,0	57

3,5 ha (5,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	1,8	3
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 66,4 ha är 100,0 % (66,4 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 95,8 %, 63,6 ha Fuktig, 4,2 %, 2,8 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,5 %, 0,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 99,5 %, 66,1 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 2,0 %, 1,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,8 %, 5,2 ha
Ej lövdominerat, 90,2 %, 59,9 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,3 ha	0,5 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,3 ha	0,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,3 ha	2,0 %
Övriga	5,2 ha	7,8 %
Summa	6,5 ha	9,8 %

6,1 ha (9,2 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/2	0,1 ha	NS	69	11800	0,2 %
1/11	0,2 ha	NO	94	13600	0,3 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/11	0,2 ha	NO	94	13600	0,3 % Ingår i certifiering	1 (11) F
1/16	1,9 ha	PG	124	91000	2,9 % Ingår i certifiering	2 (11) F
1/17	0,4 ha	NS	114	54100	0,6 % Ingår i certifiering	3 (11) F
1/26	0,4 ha	PG	149	18100	0,6 %	4 (11) F

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida							
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig		
1/28	0,2 ha	PG	104	63100	0,3 %	Ingår i certifiering	5 (11) F
1/31	0,7 ha	NS	84	33400	1,1 %	Ingår i certifiering	6 (11) F
1/32	0,8 ha	PG	64	53200	1,2 %	Ingår i certifiering	7 (11) F
1/37	0,1 ha	PG	84	17200	0,2 %	Ingår i certifiering	8 (11) F
1/45	0,4 ha	PG	64	16300	0,6 %	Ingår i certifiering	9 (11) F
1/47	0,5 ha	PG	59	17200	0,8 %	Ingår i certifiering	10 (11) F
1/49	0,9 ha	PG	64	17200	1,4 %	Ingår i certifiering	11 (11) F

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,3 ha	0,5 %	0,0 ha	0,0 %	0,3 ha	0,5 %
Lövdominans F	1,3 ha	2,0 %	5,2 ha	7,8 %	6,5 ha	9,8 %
Sumpskog	0,6 ha	0,9 %	0,7 ha	1,1 %	1,3 ha	2,0 %
Nyckelbiotop	0,7 ha	1,0 %	0,0 ha	0,0 %	0,7 ha	1,0 %
SLU Rödlistan	1,1 ha	1,7 %	0,0 ha	0,0 %	1,1 ha	1,7 %
Särskilt viktiga vatten	1,1 ha	1,7 %	0,6 ha	0,8 %	1,7 ha	2,5 %
VMI-tytor	0,2 ha	0,2 %	0,2 ha	0,2 %	0,3 ha	0,5 %
Speciella värden saknas	0,5 ha	0,8 %	53,9 ha	81,2 %	54,4 ha	81,9 %
Produktiv skogsmark	3,8 ha	5,7 %	62,6 ha	94,3 %	66,4 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/5	0,1 ha	PG	37	90100	Sumpskog 1 (15)
1/6	0,6 ha	PG	37	90100	Sumpskog 2 (15)
1/8	0,4 ha	PG	13	X0000	Särskilt viktiga vatten 3 (15)
1/8	0,1 ha	PG	13	X0000	VMI-tytor 4 (15)
1/9	0,2 ha	NO	89	09100	Särskilt viktiga vatten 5 (15)
1/11	0,2 ha	NO	94	13600	Särskilt viktiga vatten 6 (15)
1/11	<0,1 ha	NO	94	13600	VMI-tytor 7 (15)
1/12	0,2 ha	PG	154	X0000	Särskilt viktiga vatten 8 (15)
1/12	<0,1 ha	PG	154	X0000	VMI-tytor 9 (15)
1/14	0,6 ha	NO	144	72100	Särskilt viktiga vatten 10 (15)
1/14	0,1 ha	NO	144	72100	VMI-tytor 11 (15)


Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/17	0,1 ha	NS	114	54100	Särskilt viktiga vatten	12 (15)
1/36	0,7 ha	NO	119	09100	Nyckelbiotop	13 (15)
1/36	0,6 ha	NO	119	09100	Sumpskog	14 (15)
1/36	1,1 ha	NO	119	09100	SLU Rödlistan	15 (15)

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 66,4 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 5,3 %, 3,5 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 94,7 %, 62,9 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Näset 58:3 PEFC	1/11	0,2	0,3	NO	94	13600	181	36	1/6
	1/14	0,6	0,9	NO	144	72100	128	77	2/6
	1/17	0,4	0,6	NS	114	54100	188	75	3/6
	1/24	0,5	0,8	NO	164	64000	214	107	4/6
	1/31	0,7	1,1	NS	84	33400	283	198	5/6
	1/36	1,1	1,6	NO	119	09100	319	351	6/6
Summa		3,5	5,3				241	844	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Näset 58:3 PEFC	1/11	0,2	0,3	NO	94	13600	181	36	1/10
	1/16	1,9	2,8	PG	124	91000	173	329	2/10
	1/17	0,4	0,6	NS	114	54100	188	75	3/10
	1/28	0,2	0,3	PG	104	63100	252	50	4/10
	1/31	0,7	1,1	NS	84	33400	283	198	5/10
	1/32	0,8	1,2	PG	64	53200	164	131	6/10
	1/37	0,1	0,2	PG	84	17200	245	24	7/10
Näset 58:3 PEFC	1/45	0,4	0,6	PG	64	16300	181	72	8/10
Näset 58:3 PEFC	1/47	0,5	0,8	PG	59	17200	116	58	9/10

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
1/49	0,9	1,3	PG	64	17200	203	183	10/10
Summa	6,1	9,2				190	1156	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

66,4

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-07-30 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,61

Totalt kolförråd

ton

Kol

6 587

Koldioxid CO₂e


24 136

Kolförråd, ton/ha

	2025	2035
Barr/löv	1,3	1,1
Grenar	8,3	8,7
Stamved	31,4	33,9
Stubbar och rötter	14,7	16,0
Förna och markbundet kol	43,5	45,6
	99,2	105,3

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-6,7	-6,7	-6,7
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-6,5	-6,5	-7,5
Röjning	-1,8	-1,8	-1,2
	-15,0	-15,0	-15,4

Totalt kolförråd, ton/ha



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv (F)	1	7	0,2	154	T22	198	38		Beroende på utfall av NV-inventering.
Föryng avv (F)	1	12	0,2	154	T20	180	34		Beroende på utfall av NV-inventering.
Föryng avv (F)	1	23	0,2	139	T20	292	55		Beroende på utfall av NV-inventering.
Föryng avv (F)	1	26	0,4	149	G19	271	103		Beroende på utfall av NV-inventering.
Föryng avv (F)	1	56	1,8	163	T21	235	402		Beroende på utfall av NV-inventering.
Gallring	1	2 : 1	0,1	69	T20	179	6		
Gallring	1	57	0,4	53	T18	211	30		
Gallring	1	64	0,8	54	T20	194	54		
Röjningskontroll	1	8	1,1	13	T22	46	0		
Röjning (F)	1	8	1,1	13	T22	46	0		
Röjningskontroll	1	18	2,0	10	T21	18	0		
Röjningskontroll	1	22	2,2	14	T19	28	0		
Röjning (F)	1	22	2,2	14	T19	28	0		
Röjningskontroll	1	46	4,4	38	T18	55	0		
Röjning (F)	1	46	4,4	38	T18	55	0		
Röjningskontroll	1	65	5,9	18	T22	56	0		
Röjning (F)	1	65	5,9	18	T22	56	0		
Markberedning	1	38	4,4	0	G22	0	0		
Markberedning	1	51	3,0	0	T22	0	0		
Naturvårdande skötsel	1	17	0,4	114	T19	188	23		gynna löv
Inventering	1	7	0,2	154	T22	198	0		NV-inventering maa av hög beståndsålder.
Inventering	1	12	0,2	154	T20	180	0		NV-inventering maa av hög beståndsålder.
Inventering	1	19	1,0	85	T21	246	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	1	23	0,2	139	T20	292	0		NV-inventering maa av hög beståndsålder.
Inventering	1	26	0,4	149	G19	271	0		NV-inventering maa av hög beståndsålder.
Inventering	1	56	1,8	163	T21	235	0		NV-inventering maa av hög beståndsålder.
Gallring	2	6	0,6	37	T20	112	30		
Gallring	2	32	0,8	64	T18	164	53		
Gallring	2	34	4,5	69	T20	178	321		
Gallring	2	43	4,2	40	T19	95	177		
Gallring	2	49	0,9	64	G21	203	75		
Gallring	2	60	1,1	58	T20	158	71		
Gallring	2	61	0,7	58	T20	202	49		
Gallring	2	62	0,3	43	T20	139	15		
Gallring	2	67	0,4	63	T22	186	30		
Röjning (F)	2	18	2,0	10	T21	18	0		
Plantering (F)	2	38	4,4	0	G22	0	0		
Plantering (F)	2	51	3,0	0	T22	0	0		
Inventering	2	2	0,1	69	G19	197	0		
Föryng avv	3	15	0,9	124	T20	209	195		
Föryng avv	3	16	1,9	124	T20	173	342		
Föryng avv	3	28	0,2	104	T19	252	52		
Gallring (A)	3	8	1,1	13	T22	46	(30)		
Gallring	3	45	0,4	64	G21	181	30		
Gallring (A)	3	46	4,4	38	T18	55	(112)		
Gallring	3	50	0,8	40	T19	83	30		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	58	0,6	43	T18	122	27		
Gallring	3	59	0,2	53	T18	124	10		
Gallring	3	63	0,3	48	T20	149	19		
Gallring	3	68	1,5	24	T22	99	71		
Återväxtkontroll (F)	3	38	4,4	0	G22	0	0		
Återväxtkontroll (F)	3	51	3,0	0	T22	0	0		
Röjningskontroll (F)	4	38	4,4	0	G22	0	0		
Röjning (F)	4	38	4,4	0	G22	0	0		
Röjningskontroll (F)	4	51	3,0	0	T22	0	0		
Röjning (F)	4	51	3,0	0	T22	0	0		

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		7,4				7,4
Plantering, Följd			7,4			7,4
Återväxtkontroll, Följd				7,4		7,4
Röjning, Följd		13,6	2,0		7,4	23,0
Röjningskontroll		15,6				15,6
Röjningskontroll, Följd					7,4	7,4
Summa ha		36,6	9,4	7,4	14,8	68,2

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	1,5	71		71								
30 - 39	0,6	27	3	30								
40 - 49	6,2	254	13	267								
50 - 59	3,2	213	1	214								
60 - 69	7,1	463	51	514								
70 - 79												
80 - 89												
90 - 99												
100 - 109					0,2	47	5	52				
110 - 119									0,4	20	2	22
120 +					5,6	1159	11	1170				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	18,6	1028	68	1096	5,8	1206	16	1222	0,4	20	2	22
Högre alt.				1238								22
Lägre alt.				956				590				22
Total avverkning												
- högre alt.												
- lägre alt.												
m³sk/ha efter 10 år												
- högre alt.												
- lägre alt.												
2 340	2 482	1 568	137	135	150							

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				5,8		
- 9 år				7,4		
10 - 19	612		612			
20 - 29	100		100	11,2	1089	97
30 - 39	321	22	343	1,5	177	118
40 - 49	391	35	426	7,5	888	118
50 - 59	310	8	318	7,9	1109	140
60 - 69	304	39	343	5,8	1085	187
70 - 79	22	1	23	7,2	1128	157
80 - 89	389	27	416	0,3	107	357
90 - 99	97	7	104	6,8	2257	332
100 - 109	5		5	2,4	487	203
110 - 119	78	5	83			
120 +	95	1	96	2,6	700	269
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					83	
Summa	2724	145	2869	66,4	9110	137

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
4	Röjning	2009	0,9			
4	Gallring	2025	0,9	58	48	Källa: SÄ Stefan Graaf
5	Röjning	2009	1,6			
5	Gallring	2025	1,6	85	71	Källa: SÄ Stefan Graaf
6	Röjning	2009	0,6			
8	Föryng avv	2009-06-26	1,1			Källa: SKS
8	Markberedning	2011	1,1			
8	Plantering	2012	1,1			
18	Föryng avv	2009-06-26	2,0			Källa: SKS
18	Markberedning	2011	2,0			
18	Plantering	2012	2,0			
22	Föryng avv	2010-09-04	2,2			Källa: SKS
22	Markberedning	2011	2,2			
22	Plantering	2012	2,2			
38	Underv röj f föryng avv	2024-12-12	4,4			Källa: ÄB
38	Föryng avv	2025	4,4	1531	1276	Källa: SÄ Stefan Graaf

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
51	Föryng avv	2025	0,6	124	103	Källa: SÄ Stefan Graaf
55	Gallring	2008	1,7			
55	Gallring	2025	1,7	175	146	Källa: SÄ Stefan Graaf
57	Gallring	2012	0,4	16	13	
58	Gallring	2012	0,6	15	13	
59	Gallring	2012	0,2	5	4	
60	Gallring	2012	1,2	49	41	
61	Gallring	2012	0,7	46	38	
62	Gallring	2012	0,3	8	7	
63	Gallring	2012	0,3	9	8	
64	Gallring	2012	0,8	43	36	
65	Föryng avv	2007	6,3	337	281	
66	Gallring	2008	0,3	13	11	
69	Gallring	2008	1,4	81	68	
69	Gallring	2025	1,4	98	82	Källa: SÄ Stefan Graaf
70	Gallring	2008	2,1	205	171	

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
70	Gallring	2025	2,1	185	154	Källa: SÅ Stefan Graaf

Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2007	Avverkning	6,3	337	281
2008	Gallring	5,5	299	249
2009	Avverkning	3,1	0	0
2009	Röjning	3,1	0	0
2010	Avverkning	2,2	0	0
2011	Markberedning	5,3	0	0
2012	Gallring	4,5	191	159
2012	Föryngring	5,3	0	0
2024	Avverkning	4,4	0	0
2025	Avverkning	5,0	1655	1379
2025	Gallring	7,7	601	501
Totalt	Avverkning	21,0	1992	1660
Totalt	Gallring	17,7	1091	909
Totalt	Röjning	3,1	0	0
Totalt	Föryngring	5,3	0	0
Totalt	Markberedning	5,3	0	0

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,1	2														Myr						
2	0,1	1	69	S3	G19	197	20	NS,s	Tall Gran Löv	2 2 96	22 	16		24	311	Smalbladig grästyp Frisk	Inventering	2			4,9	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Kan ej tillgodoräknas NO/NS certifiering pga uppdelad/<0,3ha. Beskrivning Lämpligt bestånd att lämna orört om 5 % målet NO/NS mark vill uppnås. Lövdominerat bestånd på frisk mark med enstaka tall och gran. Lämplig fylla på mark som kan lämnas för fri utveckling, med tiden kommer naturvärdet att stiga. Mål Lövdominerat bestånd med grova lövträd och död ved. Åtgärd Bevara lövandelen och gynna alla olika lövträdslagen i samband med åtgärder. Spec värden: Lövdominans A. Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 1,4 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
2:1	0,1	1	69	G1	T20	179	18	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	18 	14	946	23	212	Blåbärstyp Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	1	35	6	3,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						
3	0,1	4														Inägomark						
4	0,9	1	37	G1	T20	120	108	PG ²	Tall Löv	90 10	17 	14	818	16	212	Lingontyp Frisk					6,3	
Utf åtg: 2025 Gallring 0,9 ha 58 m³sk Källa: SÅ Stefan Graaf 2009 Rövning 0,9 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						inkl %	tillväxt m³sk																	
															ha	avd								
5	1,6	1	37	G1	T20	98	157	PG ²	Tall Löv	95 5	17	14	758	14	212		Lingontyp Frisk					5,7	iv ¹	
Spec värden:		Sumpskog 7 %.																						
Utf åtg:		2025 Gallring 1,6 ha 85 m³sk Källa: SÅ Stefan Graaf 2009 Röjning 1,6 ha																						
Priotal		Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha																						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						
5:1	0,1	5															Väg							
6	0,6	1	37	G1	T20	112	67	PG ²	Tall Löv	90 10	14	11	974	18	213		Fuktstråk Sumpskog Lingontyp Frisk	Gallring	2	35	30	5,3	ii,iv ¹	
Spec värden:		Sumpskog 100 %.																						
Generellt:		Det kan finnas gallringsbehov i slutet av planperioden. Darfor star det som en alternativ atgard. Bor inventeras i falt																						
Utf åtg:		2009 Röjning 0,6 ha																						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Måttlig lutning (3).																						
7	0,2	1	154	S2	T22	198	40	PG ²	Tall Gran	60 40	23	16	625	23	222		Varierande bonitet Varierande trädslag Blåbärstyp Frisk	Inventering Föryng avv (F) Ingen åtgärd (A)	1 1		95	38	0,4	iii ¹
Åtgärder:		Inventering: NV-inventering maa av hög beståndsålder. Föryng avv: Beroende på utfall av NV-inventering. Ingen åtgärd: Beroende på utfall av NV-inventering.																						
Priotal		Visar-%: 1,8 Gallringsmall (SKS): 1,4																						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
8	1,1	1	13	R2	T22	46	51	PG ²	Tall	100	11	8	1	7	222	Blåbärstyp Frisk	Röjningskontroll Röjning (F) Gallring (A)	1 1 3	25 35	30	6,6	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 33 %. VMI-tytor 10 %.																						
Utf åtg: 2012 Plantering 1,1 ha 2011 Markberedning 1,1 ha 2009 Föryng avv 1,1 ha Källa: SKS																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
8:1	0,1	5														Väg						
9	0,2	1	89	S3	G24	349	70	NO,b	Gran Löv	90 10	28	21	995	34	311	Kantz m älven Varier bonitet Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				8,6	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Kan ej tillgodoräknas NO/NS certifiering pga <0,3ha Beskrivning Lämpligt bestånd att lämna orört om 5 % målet NO/NS mark vill uppnås. Bestånd som kan lämnas för fri utveckling, med tiden kommer naturvärdet att stiga Mål Skog som får utvecklas fritt och skapa höga naturvärden. Åtgärd Ingen åtgärd.																						
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																						
Priotal Visar-%: 2,8																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
10	0,6	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
11	0,2	1	94	S3	G20	181	36	NO,b	Tall 10 Gran 30 Löv 60		19	14	1265	24	411		Varierande ålder Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Tillgodoräknas NO/NS certifiering trots <0,3 ha pga gränisar mot annan NO/NS. Beskrivning Surdråg längs bäck, med al och björk och inslag av gran och tall. Enstaka lågor i klenare dimensioner. Ett lämpligt bestånd att spara för naturvärden, fylla på mark , med tiden kommer naturvärdet att stiga. Mål Orörd blandskog som får utvecklas fritt, skapa mer död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %. VMI-tytor 20 %. Priotall Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 1,7 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
12	0,2	1	154	S2	T20	180	36	PG ²	Tall 100		22	16	722	22	211		Lingontyp Frisk	Inventering Föryng avv (F) Ingen åtgärd (A)	1 1	95	34	0,4	ii,iii,iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 97 %. VMI-tytor 20 %. Generellt: Enstaka granar vid vägen och mot myr/surdråg. Åtgärder: Inventering: NV-inventering maa av hög beståndsålder. Föryng avv: Beroende på utfall av NV-inventering. Ingen åtgärd: Beroende på utfall av NV-inventering. Priotall Visar-%: 1,8 Gallringsmall (SKS): 1,4 Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
14	0,6	1	144	S3	T16	128	77	NO,b	Tall Gran Löv	75 20 5	22	15	400	18	411		Källa Frisk t. fuktig mark Varierande slutenhet "Fylla på mark" Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lampligt bestånd att lamna orört om 5 % malet NO/NS mark vill uppnås. Kalla/back. Inslag av al och björk. Fynd av skagglav. Lamplig fylla pa mark som kan lamnas for fri utveckling, med tiden kommer naturvårdet att stiga. Mal Skog som far utvecklas fritt och skapa hoga naturvården. Atgard Ingen atgard. Spec värden: Särskilt viktiga vatten 97 %. VMI-tytor 20 %. Priotat Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 1,2 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
15	0,9	1	124	S2	T20	209	188	PG ²	Tall Gran	95 5	28	19	424	25	222		Lingontyp Frisk	Föryng avv	3	95	195	2,1	
Priotat Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 1,6 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
16	1,9	1	124	S2	T20	173	329	PG ²	Tall Gran	90 10	26	17	437	22	223		Varierande höjd och ålder Framtida lövdominans Lingontyp Frisk	Föryng avv	3	95	342	1,9	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Generellt: I nasta generation bor ett lovdominerat bestånd skapas, detta ar lamplig mark att bedriva lovskogsbruk pa. Lovandelen behöver hojas pa fastigheten och i området Priotat Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 1,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
17	0,4	1	114	S3	T19	188	75	NS,b	Tall Gran Löv	50 40 10	26	18	444	23	323		Varierande slutenhet Varirande höjd och ålder Frisk t. fuktig mark Blåbärstyp Frisk	Naturvårdande skötsel	1	30	23	3,0	i,iii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lampligt bestånd att lamna orort om 5 % malet NO/NS mark vill uppnås. Varierat blandbestånd pa frisk till fuktig mark. Mal Skog som far utvecklas fritt och skapa hoga naturvarden. Atgard Bestandet kan plockhuggas for att skapa grovre lov- och barrtrad. Skogen bor ej kalavverkas. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 32 %. Åtgärder: Naturvårdande skötsel: gynna löv Priotat Visar-%: 2,4 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							
18	2,0	1	10	R2	T21	18	36	PG ²	Tall	100	9	5	1	2	222		Blåbärstyp Frisk	Röjningskontroll Röjning (F)	1 2		25	3,2	
Utf åtg: 2012 Plantering 2 ha 2011 Markberedning 2 ha 2009 Föryng avv 2 ha Källa: SKS Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
19	1,0	1	85	S1	T21	246	246	PG ²	Tall	100	30	20	412	28	222		Blåbärstyp Frisk	Inventering	1			5,6	ii ¹
Generellt: Skogsskikt fran skogliga grunddata. Alder, tradslag, stamantal, atgardsbehov, standortsegenskaper bor kontrolleras. Priotat Visar-%: 2,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
22	2,2	1	14	R1	T19	28	62	PG ²	Tall	100	11	7	1	3	222		Enstaka miljögrupper Blåbärstyp Frisk	Röjningskontroll Röjning (F)	1 1		25	4,5	
Utf åtg: 2012 Plantering 2,2 ha 2011 Markberedning 2,2 ha 2010 Föryng avv 2,2 ha Källa: SKS Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						inkl %	tillväxt m³sk																	
															ha	avd								
23	0,2	1	139	S2	T20	292	58	PG ²	Tall	70	28	20	764	29	223		Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Inventering Föryng avv (F) Ingen åtgärd (A)	1 1	95	55	0,5	iii ¹	
Åtgärder: Inventering: NV-inventering maa av hög beståndsålder. Föryng avv: Beroende på utfall av NV-inventering. Ingen åtgärd: Beroende på utfall av NV-inventering.																								
Priotal Visar-%: 1,7																								
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																								
24	0,5	1	164	S3	T19	214	107	NO,s	Tall	60	21	16	1353	26	123		Skiktat Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,0	i ¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																								
Naturvård: Beskrivning Relativt gammal skiktad blandbarrskog. Just nu finns inga stora naturvärden i beståndet, men det kan avsättas för att nå upp till 5% NO/NS-mark på fastigheten. Mål Bevara den gamla skogen och skapa mer död ved, tillgång på död ved i olika former bidrar till en större artrikedom. Gamla tallar fungerar som ” boträd” för fåglar, några sällsynta knappnålslavar och skalbaggar, när sedan tallen torkar och dör blir den en viktig levnadsplats för ett stort antal hotade arter bland flora och fauna, grova torrakor och tallågor kan finnas kvar i hundratalsår. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																								
Priotal Visar-%: 1,7 Gallringsmall (SKS): 2,6																								
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																								
25	0,3	1	94	S1	G18	210	63	PG ²	Tall	40	24	17	713	25	124		Enstaka äldre tallar Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,3		
Priotal Visar-%: 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																								
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
26	0,4	1	149	S2	G19	271	108	PG ²	Tall	5	25	18	1186	28	123		Enstaka lågor Död ved Framtida lövdominans Blåbärstyp Frisk	Inventering Föryng avv (F) Ingen åtgärd (A)	1 1	95	103	0,5	ii,iii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans F. Generellt: I nasta generation bor ett lovdominerat bestånd skapas, detta ar lamplig mark att bedriva lovsogsbruk pa. Lovandelen behöver hojas pa fastigheten och i området. Pa sa satt gynnar man den biologiska mangfalden samtidigt som man varnar om landskapsbilden. Åtgärder: Inventering: NV-inventering maa av hög beståndsålder. Föryng avv: Beroende på utfall av NV-inventering. Ingen åtgärd: Beroende på utfall av NV-inventering. Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							
27	0,6	1	84	S1	G18	161	97	PG ²	Tall	20	20	15	509	21	123		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8	
Priotal Visar-%: 3,3 Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							
28	0,2	1	104	S2	T19	252	50	PG ²	Tall	60	23	18	1117	28	124		Skiktad Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Föryng avv	3	95	52	2,7	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Generellt: I nasta generation bor ett lovdominerat bestånd skapas, detta ar lamplig mark att bedriva lovsogsbruk pa. Lovandelen behöver hojas pa fastigheten och i området. Pa sa satt gynnar man den biologiska mangfalden samtidigt som man varnar om landskapsbilden Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
29	0,7	1	84	S1	G17	212	148	PG ²	Tall	30	22	16	964	25	123		Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,6	
Priotal		Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
30	0,7	1	84	S1	G19	222	155	PG ²	Tall	30	21	16	1254	27	124		Enstaka öf Tätt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,9	
Priotal		Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																					
31	0,7	1	84	S3	G19	283	198	NS,s	Tall	30	23	18	1089	31	322		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,4	i,iv ¹
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård:		Beskrivning Lämpligt bestånd att lämna orört om 5 % målet NO/NS mark vill uppnås. Lövdominerad blandskog på frisk till fuktig mark. Mål Lövdominerat bestånd med på sikt grova lövträd och död ved. Åtgärd Gynna lövträden vid åtgärd.																					
Spec värden:		Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																					
Priotal		Visar-%: 2,6																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
32	0,8	1	64	G1	T18	164	131	PG ²	Tall Gran Löv	50 30 20	20	15	649	22	122	Olikåldrigt Skiktat Enstaka evighetsträd Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Gallring	2	35	53	4,3	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																						
Generellt: I nasta generation bor ett lövdominerat bestånd skapas, detta är lämplig mark att bedriva lövskogsbruk på. Lovandelen behöver höjas på fastigheten och i området. På så sätt gynnar man den biologiska mångfalden samtidigt som man varnar om landskapsbilden																						
Prioritet: Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
33	0,5	1	94	S1	T19	203	102	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	20	16	905	26	122	Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	
Prioritet: Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
34	4,5	1	69	G1	T20	178	801	PG ²	Tall Gran Löv	70 25 5	22	16	670	23	222	Småkuperat Enstaka evighetsträd Varierande slutenhet Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	321	4,5	
Prioritet: Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
34:1	0,1	5														Väg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
36	1,1	1	119	S3	G22	319	351	NO,b	Gran Löv	95 5	25	19	896	33	411	Nyckelbiotop Olikåldrigt Äldre toppbrott Högörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				6,5	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Högörtsrik bäckzon på fuktig till blöt mark. Sumpmosslokal. Grandominerad med inslag av Tall, Rönne, Gråal, Glasbjörk. Skogsstyrelsen har klassat beståndet som nyckelbiotop. I samband med deras inventering hittades ett flertal signalarter i området. 40 år yngre i den norra delen. Mål Bevara beskuggningen av bäcken och den fuktiga miljön. Skapa förutsättningar för beståndet att utvecklas till en värdefull naturskog med mer död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Spec värden: Sumpskog 56 %. Nyckelbiotop 61 %. SLU Rödlistan 100 %. Priotal Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 2,7 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
37	0,1	1	84	S1	G21	245	25	PG ²	Tall Gran Löv	5 75 20	22	17	1762	28	311	Frisk till fuktig mark Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,6	ii,iii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Generellt: Mindre småvatten. Lövträd, där naturlig förekomst medger, värnas vid röjning och gallring så att det utgör minst 5-10% i beståndet under hela omloppstiden. Åtgärder: Ingen åtgärd: gynna löv Priotal Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
38	4,4	1	0	K1	G22	0	0	PG ²						311		Bäckdrog Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjningskontroll (F) Röjning (F)	1 2 3 4 4	 25		ii ¹		
Generellt:		Död ved i västra delen																					
Utf åtg:		2025 Föryng avv 4,4 ha 1531 m³sk Källa: SÅ Stefan Graaf 2024 Underv röj f föryng avv 4,4 ha Källa: ÄB																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
41	2,5	1	89	S1	T21	338	845	PG ²	Tall Gran Löv	64 35 1	26	20	1031	34	221		Död ved Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,7	
Priotal		Visar-%: 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
42	0,3	1	74	S1	G21	276	83	PG ²	Gran Löv	95 5	26	19	868	29	222		Luckigt Varierande höjd och ålder Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,9	
Priotal		Visar-%: 3,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
43	4,2	1	40	G1	T19	95	399	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	12	10	1550	17	212		Varierande slutenhet Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	177	4,5	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
45	0,4	1	64	G1	G21	181	72	PG ²	Tall Gran Löv	1 69 30	19	15	1179	24	311		Fukt stråk Blåbärstyp Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	3	35	30	5,3	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Generellt: Lövträd, där naturlig förekomst medger, värnas vid röjning och gallring så att det utgör minst 5-20% i beståndet under hela omloppstiden Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
46	4,4	1	38	G1	T18	55	242	PG ²	Tall Löv	95 5	9	8	1403	12	211		Varierande slutenhet Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjningskontroll Röjning (F) Gallring (A)	1 1 3	 25 35	 112	3,7	ii ¹
Generellt: Alder, SI och laserskannad höjd matchar daligt, bör kontrolleras. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
47	0,5	1	59	G1	G17	116	58	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	17	12	745	17	311		Varierande höjd Varier slutenhet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Generellt: Grandominerat bestånd med hög lövandel på frisk till fuktig mark. Lövträd, där naturlig förekomst medger, värnas vid röjning och gallring så att det utgör minst 5-10% i beståndet under hela omloppstiden Priotal Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
48	1,1	2															Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
49	0,9	1	64	G1	G21	203	183	PG ²	Tall Gran Löv	1 79 20	20	15	1065	25	311		Frisk t. fuktig mark Stig Varierande ålder Varierande slutenhet Smalbladig grästyp Fuktig	Gallring Ingen åtgärd (A)	2	35	75	6,0	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Generellt: I nasta generation bor ett lovdominerat bestånd skapas, detta ar lamplig mark att bedriva lovsogsbruk pa. Lovandelen behovr hojas pa fastigheten och i området. Pa sa satt gynnar man den biologiska mangfalden samtidigt som man varnar om landskapsbilden. Priotat Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
50	0,8	1	40	G1	T19	83	66	PG ²	Tall Gran Löv	85 10 5	12	10	1155	15	221		Varierande slutenhet Älgskador Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	3	35	30	4,2	ii ¹
Generellt: Alder, SI och laserskannad hojd matchar daligt, bor kontrolleras. Priotat Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
51	3,0	1	0	K1	T22	0	0	PG ²							122		Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjningskontroll (F) Röjning (F)	1 2 3 4 4				
Utf åtg: 2025 För yng avv 0,6 ha 124 m³sk Källa: SÄ Stefan Graaf Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Sifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
55	1,7	1	40	G1	T23	191	325	PG ²	Tall Gran Löv	80 5 15	22	18	755	22	123		Blåbärstyp Frisk					8,2	
Utf åtg: 2025 Gallring 1,7 ha 175 m³sk Källa: SÅ Stefan Graaf 2008 Gallring 1,7 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																							
55:1	0,1	5															Väg						
56	1,8	1	163	S2	T21	235	423	PG ²	Tall Gran	80 20	21	17	1012	29	234		Framtida lövdominans Lingontyp Frisk	Inventering Föryng avv (F) Ingen åtgärd (A)	1 1	95	402	0,4	iii ¹
Åtgärder: Inventering: NV-inventering maa av hög beståndsålder. Föryng avv: Beroende på utfall av NV-inventering. Ingen åtgärd: Beroende på utfall av NV-inventering. Priotal Visar-%: 1,6 Gallringsmall (SKS): 2,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																							
56:1	0,1	6															Nässjön						
57	0,4	1	53	G1	T18	211	84	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	20	16	841	28	212		Enstaka äldre tallar Gynna löv Lingontyp Frisk	Gallring	1	35	30	5,2	
Utf åtg: 2012 Gallring 0,4 ha 16 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
58	0,6	1	43	G1	T18	122	73	PG ²	Tall Löv	90 10	18	13	932	19	211		Gruppställt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Gallring	3	30	27	5,0	
Utf åtg: 2012 Gallring 0,6 ha 15 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
59	0,2	1	53	G1	T18	124	25	PG ²	Tall	100	19	14	689	19	211		Lingontyp Frisk	Gallring	3	35	10	4,3	
Utf åtg: 2012 Gallring 0,2 ha 5 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
60	1,1	1	58	G1	T20	158	174	PG ²	Tall	100	21	15	644	22	211		Brandspår Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Gallring	2	35	71	4,9	
Utf åtg: 2012 Gallring 1,2 ha 49 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
60:1	0,1	5															Väg						
61	0,7	1	58	G1	T20	202	141	PG ²	Tall	100	23	17	465	25	211		Brandspår Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	49	5,8	
Utf åtg: 2012 Gallring 0,7 ha 46 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
61:1	0,1	5														Väg						
62	0,3	1	43	G1	T20	139	42	PG ²	Tall	100	19	14	792	21	221	Gallrat2012 Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	15	5,8	
Utf åtg:		2012 Gallring 0,3 ha 8 m³sk																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
63	0,3	1	48	G1	T20	149	45	PG ²	Tall	100	20	15	501	21	211	Gruppställt Ojämnt Lingontyp Frisk	Gallring	3	35	19	5,4	
Utf åtg:		2012 Gallring 0,3 ha 9 m³sk																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
64	0,8	1	54	G1	T20	194	155	PG ²	Tall	100	22	16	573	25	122	Gallrat 2012 Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	54	5,1	
Utf åtg:		2012 Gallring 0,8 ha 43 m³sk																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
65	5,9	1	18	G1	T22	56	330	PG ²	Tall	100	9	7	1082	12	222	Blåbärstyp Frisk	Röjningskontroll Röjning (F)	1 1	 25	 	6,3	
Utf åtg:		2007 Föryng avv 6,3 ha 337 m³sk																				
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
65:1	0,1	5														Väg						
65:2	0,2	5														Väg						
66	0,3	1	88	S1	T22	195	59	PG ²	Tall Gran	80 20	23	17	768	25	221	Gallrat 2008 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,9	
Utf åtg:		2008 Gallring 0,3 ha 13 m³sk																				
Priotal		Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
67	0,4	1	63	G1	T22	186	74	PG ²	Tall Gran	60 40	20	16	729	25	222	Blåbärstyp Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	2	35	30	5,3	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
68	1,5	1	24	G1	T22	99	149	PG ²	Tall Gran	95 5	14	11	1426	17	222	Enstaka miljöträd Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	35	71	6,6	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
69	1,4	1	93	S1	G21	131	183	PG ²	Tall Gran	30 70	22	16	531	17	222	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	
Utf åtg:		2025 Gallring 1,4 ha 98 m³sk Källa: SÅ Stefan Graaf 2008 Gallring 1,4 ha 81 m³sk																				
Priotal		Visar-%: 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
70	2,1	1	53	G1	T21	164	344	PG ²	Tall Gran Löv	85 13 2	25	19	380	19	221	Lingontyp Frisk					6,2	
Utf åtg: 2025 Gallring 2,1 ha 185 m³sk Källa: SÅ Stefan Graaf 2008 Gallring 2,1 ha 205 m³sk																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avd 2

NS

Skogliga data

Areal: 0,1 ha

Ålder: 69 år

Ståndortsindex: G19

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 197 m³sk/ha och 20 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 2% tall 2% gran 96% löv

Kan ej tillgodoräknas NO/NS certifiering pga uppdelad/<0,3ha.

Beskrivning

Lämpligt bestånd att lämna orört om 5 % målet NO/NS mark vill uppnås. Lövdominerat bestånd på frisk mark med enstaka tall och gran. Lämplig "fylla på mark" som kan lämnas för fri utveckling, med tiden kommer naturvärdet att stiga.

Mål

Lövdominerat bestånd med grova lövträd och död ved.

Åtgärd

Bevara lövandelen och gynna alla olika lövträdslagen i samband med åtgärder.

Avd 9

NO

Skogliga data

Areal: 0,2 ha

Ålder: 89 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 349 m³sk/ha och 70 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% gran 10% löv

Kan ej tillgodoräknas NO/NS certifiering pga <0,3ha

Beskrivning

Lämpligt bestånd att lämna orört om 5 % målet NO/NS mark vill uppnås. Bestånd som kan lämnas för fri utveckling, med tiden kommer naturvärdet att stiga

Mål

Skog som får utvecklas fritt och skapa höga naturvärden.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 11

NO

Skogliga data

Areal: 0,2 ha

Ålder: 94 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 181 m³sk/ha och 36 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 30% gran 60% löv

Tillgodoräknas NO/NS certifiering trots <0,3 ha pga gränisar mot annan NO/NS.

Beskrivning

Surdråg längs bäck, med al och björk och inslag av gran och tall. Enstaka lågor i klenare dimensioner. Ett lämpligt bestånd att spara för naturvärden, "fylla på mark", med tiden kommer naturvärdet att stiga.

Mål

Orörd blandskog som får utvecklas fritt, skapa mer död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 14

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 144 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 128 m³sk/ha och 77 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 75% tall 20% gran 5% löv

Beskrivning

Lämpligt bestånd att lämna orört om 5 % målet NO/NS mark vill uppnås. Källa/bäck. Inslag av al och björk. Fynd av skägglav. Lämplig "fylla på mark" som kan lämnas för fri utveckling, med tiden kommer naturvärdet att stiga.

Mål

Skog som får utvecklas fritt och skapa höga naturvärden.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 17

NS

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 114 år

Ståndortsindex: T19

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 188 m³sk/ha och 75 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 40% gran 10% löv

Beskrivning

Lämpligt bestånd att lämna orört om 5 % målet NO/NS mark vill uppnås. Varierat blandbestånd på frisk till fuktig mark.

Mål

Skog som får utvecklas fritt och skapa höga naturvärden.

Åtgärd

Beståndet kan plockhuggas för att skapa grövre löv- och barrträd. Skogen bör ej kalavverkas.

Avd 24

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 164 år

Ståndortsindex: T19

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 214 m³sk/ha och 107 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% gran

Beskrivning

Relativt gammal skiktad blandbarrskog. Just nu finns inga stora naturvärden i beståndet, men det kan avsättas för att nå upp till 5% NO/NS-mark på fastigheten.

Mål

Bevara den gamla skogen och skapa mer död ved, tillgång på död ved i olika former bidrar till en större artrikedom. Gamla tallar fungerar som "boträd" för fåglar, några sällsynta knappnåls lavar och skalbaggar, när sedan tallen torkar och dör blir den en viktig levnadsplats för ett stort antal hotade arter bland flora och fauna, grova torrakor och tallågor kan finnas kvar i hundratalsår.

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling.

Avd 31

NS

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 84 år

Ståndortsindex: G19

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 283 m³sk/ha och 198 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 30% gran 40% löv

Beskrivning

Lämpligt bestånd att lämna orört om 5 % målet NO/NS mark vill uppnås. Lövdominerad blandskog på frisk till fuktig mark.

Mål

Lövdominerat bestånd med på sikt grova lövträd och död ved.

Åtgärd

Gynna lövträden vid åtgärd.

Avd 36

NO

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 119 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 319 m³sk/ha och 351 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% gran 5% löv

Beskrivning

Högörtsrik bäckzon på fuktig till blöt mark. Sumpmosslokal. Grandominerad med inslag av Tall, Rönn, Gråal, Glasbjörk. Skogsstyrelsen har klassat beståndet som nyckelbiotop. I samband med deras inventering hittades ett flertal signalarter i området. 40 år yngre i den norra delen.

Mål

Bevara beskuggningen av bäcken och den fuktiga miljön. Skapa förutsättningar för beståndet att utvecklas till en värdefull naturskog med mer död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Generella kommentarer

Avd 6	Det kan finnas gallringsbehov i slutet av planperioden. Därför står det som en alternativ åtgärd. Bör inventeras i falt
Avd 12	Enstaka granar vid vägen och mot myr/surdråg.
Avd 16	I nästa generation bör ett lövdominerat bestånd skapas, detta är lämplig mark att bedriva lövskogsbruk på. Lövandelen behöver höjas på fastigheten och i området
Avd 19	Skogsskikt från skogliga grunddata. Ålder, trädslag, stamantal, åtgärdsbehov, ståndortsegenskaper bör kontrolleras.
Avd 26	I nästa generation bör ett lövdominerat bestånd skapas, detta är lämplig mark att bedriva lövskogsbruk på. Lövandelen behöver höjas på fastigheten och i området. På så sätt gynnar man den biologiska mångfalden samtidigt som man värnar om landskapsbilden.
Avd 28	I nästa generation bör ett lövdominerat bestånd skapas, detta är lämplig mark att bedriva lövskogsbruk på. Lövandelen behöver höjas på fastigheten och i området. På så sätt gynnar man den biologiska mångfalden samtidigt som man värnar om landskapsbilden
Avd 32	I nästa generation bör ett lövdominerat bestånd skapas, detta är lämplig mark att bedriva lövskogsbruk på. Lövandelen behöver höjas på fastigheten och i området. På så sätt gynnar man den biologiska mångfalden samtidigt som man värnar om landskapsbilden
Avd 37	Mindre småvatten. Lövträd, där naturlig förekomst medger, värnas vid röjning och gallring så att det utgör minst 5-10% i beståndet under hela omloppstiden.
Avd 38	Död ved i västra delen
Avd 45	Lövträd, där naturlig förekomst medger, värnas vid röjning och gallring så att det utgör minst 5-20% i beståndet under hela omloppstiden

Generella kommentarer

- Avd 46** Ålder, SI och laserskannad höjd matchar dåligt, bör kontrolleras.
- Avd 47** Grandominerat bestånd med hög lövandel på frisk till fuktig mark. Lövträd, där naturlig förekomst medger, värnas vid röjning och gallring så att det utgör minst 5-10% i beståndet under hela omloppstiden
- Avd 49** I nästa generation bör ett lövdominerat bestånd skapas, detta är lämplig mark att bedriva lövskogsbruk på. Lövandelen behöver höjas på fastigheten och i området. På så sätt gynnar man den biologiska mångfalden samtidigt som man värnar om landskapsbilden.
- Avd 50** Ålder, SI och laserskannad höjd matchar dåligt, bör kontrolleras.